

IMUNOCHEMIE SPECIÁLNÍ-SÉRUM				Spec. vyšetření	
HORMONY		TU-markery			
☐ HCG	☐	☐ AFP	☐	☐ kostní iso ALP	
☐ E2	++	☐ CEA	☐	☐ P1NP	
☐ FSH	++	☐ PSA	☐	☐ CrossLaps	
☐ LH	++	☐ FPSA	☐	☐ Vit. D	
☐ progesteron	++	☐ CA 19-9	☐	☐	
☐ PRL	++	☐ CA 125	☐	☐	
☐ TST	★	☐ CA 153	☐	☐ folát	
☐ E3	★	☐ β-HCG	++	☐ vit. B12	
☐ DHEAS	★	☐ TRGL	++	☐ homocystein	
☐ kortizol	★	☐ β ₂ – mikroglobulin	☐	☐	
☐ parathormon	☐	☐ HE4	++	Preeklampsie	
☐ C-peptid „před“	++	☐ premenopauzální	☐	☐ PIGF	☐
☐ C-peptid „po“	++	☐ postmenopauzální	☐	☐ sFit-1	☐
☐ Cyfra 21-1	++	☐ CA 72-4	++	☐ gest. týden:	☐
☐ NSE	++	☐		Monitorování hladin antibiotik	
Thyr. hormony		Způsob podávání		Odběr:	
☐ TSH	☐	☐ TRAK	☐ 1x denně	☐ před podáním	
☐ FT4	☐	☐	☐ 2x nebo 3x denně	☐ po podání	
☐ anti-TPO	☐	☐	☐ kontinuálně	☐ vankomycin	☐
☐ anti-TG	☐	☐ T3		☐ amikacin	☐
☐ FT3	☐	☐ T4		☐ gentamicin	☐
Toxikologie				Léky	
Moč		☐ alkohol		☐ phenytoin	☐
☐ lékový screening	☐	☐ methanol		☐ valproát	☐
☐ drogový screening	☐	☐ org. rozpouštědla		☐ phenobarbitat	☐
☐ kotinin	☐	☐ etylenglykol		☐ theophylin	☐
☐ etylglukuroid	☐	☐ jiné		☐ digoxin	☐
Sérum		Vyšetření jiného materiálu		☐ carbamazepin	☐
☐ benzodiazepiny	☐	☐ zvratky		☐ paracetamol	☐
☐ barbituráty	☐	☐ jiné		☐ levetiracetam	
☐ tric. antidepres.	☐	☐		☐ lamotrigin	
☐	☐	☐		☐ topiramát	
Doplňující údaje pro analýzu				☐	
Toxikologická anamnéza				☐	
Okolnosti případu				☐	
☐ Intoxikace	Farmakoterapie			☐	
☐ Abusus drog				☐	
☐ Kontrola					
☐ Jiné	Další informace:			Mozkom. mok	
Pozitivní orientační screening standardně potvrzujeme specifickými metodami (GCMS, LCMS) v běžné pracovní době. ☐ Neprovádět				☐ glukóza	☐
				☐ Cl	☐
				☐ bílkovina celk.	☐
				☐ spektrofot.	☐
				☐ laktát	☐

Vyšetření označená * provádí smluvní laboratoř MeDiLa spol. s r. o.

Vyšetření označená ++ provádí Oddělení klinické biochemie Chrudimské nemocnice