

Telekonferenční přednáškový večer 15. 4. 2021

1. **MUDr. Jan Štuk** (onkologie-Multiscan) se zabýval radioterapií nádorů hlavy a krku. V první části přednášky zmínil epidemiologická data, rizikové faktory (kouření, alkohol, virové infekce) a postavení radioterapie v léčbě nádorů hlavy a krku. Následně zúčastněné seznámil s jednotlivými technikami radioterapie používané v Multiscanu Pardubice. V poslední době jsou používané techniky založené na radioterapii řízené obrazem, nejčastěji se jedná o objemově modulovanou radioterapii kyvem. V druhé části přednášky popsal jednotlivé kroky plánovacího procesu u pacientů s nádory hlavy a krku.
2. **Doc. MUDr. Jan Novák, CSc. (+ MUDr. Otrošinová; oční odd.)** popsal různé typy „kapsulárního distenzního syndromu“, který vzniká nahromaděním tekutiny v prostoru před čočkou či za ní. Tyto syndromy se vyskytují nejčastěji po operaci čočky. Lze je znázornit různými metodami – avšak ultrazvuková metoda je snadno proveditelná a dislokaci čočky i nahromadění tekutiny věrně znázorní. Tekutinu však je třeba invazivně odstranit. Syndrom je vzácný a autoři předvedli soubor 9 pacientů.
3. **MUDr. Ondřej Kabelka** (+ spoluautoři z ortopedického oddělení) uvedl problematiku zadní luxace ramenního kloubu, typické situace (epileptický záchvat, trauma), klinickou symptomatologii, nález na RTG vyšetření (a CT) i možnosti operativy. Na RTG ramenního kloubu se vyskytuje příznak „žárovky“. Zadní luxace bývá zpočátku nepoznána – v akutní fázi až v 80 %. Podle velikosti defektu hlavice pak ortopedická léčba spočívá v transpozici šlachy m. subscapularis (lehké případy), využití autoštěpů a v těžkých případech (defekt nad 50 %) v aloplastice. Autor uvedl soubor 7 pacientů operovaných na ortopedickém oddělení.
4. **MUDr. Miroslav Prekop** (plicní odd.) popsal příčiny vzniku, klinický obraz, pomocná vyšetření i léčebné možnosti Hammanova syndromu. Syndrom se vyznačuje jak pneumomediastinem tak i podkožním emfyzémem. Pojem „Hammanův příznak“ zahrnuje auskultačně zjistitelné systolické krepitace v prekordiu a nižší intenzitu ozev. Vyskytuje se u různých chorob – ruptur alveolů a průnik vzduchu kolem bronchů do mediastina, kašel, spirometrie, nazální aplikaci kyslíku.